

JOSÉ GILBERTO PEREIRA

Síndrome de Stevens-Johnson relacionada a dipirona (metamizol):
Relato de caso e revisão da literatura

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde.

Área de concentração: Doenças Infecciosas e Parasitárias e Saúde do Homem

Orientador: Prof. Dr. Roberto Kenji Nakamura
Cuman

Maringá

2006

RESUMO

Introdução: A síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) é uma doença rara e grave caracterizada por erupções eritemato-bolhosas na pele. Em até 70% dos casos ela pode ser devida a medicamentos. À medida que aumentam a diversidade da farmacoterapia e o conseqüente acesso aos medicamentos, da mesma maneira se eleva a incidência da SSJ. **Objetivo:** Este estudo pretende proceder à apresentação de um caso de SSJ adversa a medicamento e determinar sua relação causal com a dipirona. **Método:** Um homem branco de 28 anos de idade desenvolveu uma reação adversa grave após ter tomado um medicamento, de venda sem prescrição, composto de dipirona. O paciente deu entrada no hospital com queixas de prurido intenso e erupções cutâneas nas palmas das mãos, sola dos pés, braços e pernas, incluindo lesões nas mucosas oral, genital e ocular. **Resultados e Discussão:** A avaliação clínica resultou SSJ, que foi ratificada com base na revisão da literatura e consulta as diretrizes clínicas. A imputabilidade da dipirona foi determinada de acordo com um novo método de avaliação de causalidade. A pontuação final da avaliação causal resultou em 2,5 pontos pelo método de Arimone et al., o que equivale à probabilidade de 92% da SSJ ter sido causada pela dipirona. **Conclusão:** Concluiu-se que, conseqüentemente ao complexo processo de diferenciação das doenças eritematosas, bem como a raridade de sua ocorrência, é necessário sempre proceder à revisão clínica como prova diagnóstica da SSJ. O método usado para avaliação causal foi apropriado para definir o grau de imputabilidade de fármacos que causam reações adversas graves e raras.

Palavras-chave: Síndrome de Stevens-Johnson, erupções eritematosas cutâneas, dipirona, reação adversa a medicamentos, segurança e monitorização de medicamentos, avaliação de causalidade.